

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore
ACIDO SALICILICO NA 2% unguento
ACIDO SALICILICO NA 5% unguento
ACIDO SALICILICO NA 10% unguento
Acido salicilico

Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.
- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcune settimane di trattamento.

Contenuto di questo foglio:

1. Cos'è ACIDO SALICILICO NA e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare ACIDO SALICILICO NA
3. Come usare ACIDO SALICILICO NA
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare ACIDO SALICILICO NA
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Cos'è ACIDO SALICILICO NA e a cosa serve

ACIDO SALICILICO NA appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati cheratolitici che distruggono la cheratina in eccesso.

Questo medicinale è indicato negli adulti e nei bambini per:

- il trattamento di psoriasi, acne vulgaris, seborrea;
- la rimozione di verruche e calli.

Negli adulti ACIDO SALICILICO NA è indicato anche per il trattamento locale di eczemi ed ittiosi.

2. Cosa deve sapere prima di usare ACIDO SALICILICO NA

Non usi ACIDO SALICILICO NA

- se è allergico all'acido salicilico, ai salicilati o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se il paziente è un bambino di età inferiore ai 2 anni;
- se soffre di diabete;
- se soffre di malattie alle vene (vasculopatia periferica).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare ACIDO SALICILICO NA.

Non ingerisca il medicinale ed eviti di mettere ACIDO SALICILICO NA a contatto con bocca, occhi, genitali e altre mucose. ACIDO SALICILICO NA è irritante e può provocare infiammazione della pelle (dermatiti).

Se utilizza questo medicinale per il trattamento di calli e verruche, protegga la pelle sana intorno alla zona da trattare.

Il medicinale potrebbe essere infiammabile. Non utilizzi o conservi vicino a fiamme libere o qualsiasi fonte di calore.

È possibile osservare un miglioramento della cute trattata dopo 6 settimane di terapia oppure dopo 12 settimane in caso di rimozione di una verruca.

Eviti di utilizzare ACIDO SALICILICO NA:

- per lunghi periodi di tempo;
- in quantità elevate;
- su estese zone del corpo;
- su pelle lesa o infiammata.

Una quantità eccessiva del medicinale può causare reazioni avverse molto gravi, specie nei bambini (avvelenamento sistemico da salicilati), che può essere fatale.

Bambini

Questo medicinale deve essere somministrato con cautela nei bambini e sotto il controllo del medico in quanto l'esperienza sull'uso di acido salicilico in questa popolazione è limitata.

Altri medicinali e ACIDO SALICILICO NA

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Faccia particolare attenzione e informi il medico se sta assumendo o ha assunto recentemente i seguenti medicinali:

- **anticoagulanti** cumarinici come acenocumarolo, dicumarolo, fenprocumon e warfarin, o altri anticoagulanti come anisindione, fenidione perché può aumentare il rischio di sanguinamento;
- **inibitori del fattore X** attivato dalla coagulazione (eparine ed eparionidi), poiché in caso di anestesia neuroassiale (spinale o epidurale), l'uso contemporaneo di acido salicilico può provocare un rapido aumento del rischio di sanguinamento e di ematoma.
- **gliburide**, un medicinale utilizzato per il trattamento del diabete, perché possono diminuire i livelli di zucchero nel sangue;
- **probenecid**, un medicinale utilizzato per il trattamento della gotta, perché l'acido salicilico può invertirne gli effetti;
- **acetazolamide**, un medicinale utilizzato contro la pressione alta negli occhi (glaucoma), perché gli effetti indesiderati dell'acido salicilico possono aumentare;
- **vaccino della varicella**, perché aumenta il rischio di una malattia chiamata sindrome di Reye.

Eviti di usare ACIDO SALICILICO NA insieme a tamarindo e/o Salvia miltiorrhiza o Tan-Shen perché si può verificare un rapido aumento dei livelli di medicinale nel sangue.

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Eviti di usare ACIDO SALICILICO NA se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno, se non in caso di assoluta necessità.

Non deve usare ACIDO SALICILICO NA durante la gravidanza, ad eccezione di un trattamento a breve termine di una singola area di piccole dimensioni della cute/una verruca/un callo/un occhio di pernice.

Le forme orali (ad esempio le compresse) di questa classe di medicinali possono causare effetti avversi nel feto. Non è noto se gli stessi rischi siano da considerare per ACIDO SALICILICO NA quando è usato su cute/verruche/ calli/ occhi di pernice.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Questo medicinale non altera la capacità di guidare e di utilizzare macchinari.

3. Come usare ACIDO SALICILICO NA

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Applichi la minima quantità di unguento sulla zona da trattare con un leggero massaggio. Inizi il trattamento applicando il medicinale soltanto su una piccola porzione di pelle oppure una sola volta al giorno, così da non irritare la pelle.

Se usa più ACIDO SALICILICO NA di quanto deve

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio per questo medicinale se applicato sulla pelle localmente.

Tuttavia, in caso di uso prolungato e su estese zone del corpo o su pelle lesa e infiammata, si potrebbero verificare sintomi del salicilismo come nausea, vomito, disturbi dell'udito (acufeni o tinnito) e vertigini.

Raramente si possono verificare anche problemi respiratori (asma), problemi a stomaco (ulcera gastrica), fegato, reni (insufficienza renale), pancreas.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di ACIDO SALICILICO NA, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere stabilita in base ai dati disponibili):

- diminuzione dei livelli di glucosio nel sangue (ipoglicemia);
- irritazione e infiammazione della pelle (dermatiti, eritema, bruciore, prurito, desquamazione della pelle), cicatrici sul viso.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare ACIDO SALICILICO NA

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.

Conservare nel contenitore ben chiuso al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore o fiamme libere in quanto Acido Salicilico NA potrebbe essere infiammabile.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese e al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Dopo la prima apertura del contenitore, il medicinale deve essere utilizzato entro 30 giorni. Trascorso tale periodo il medicinale residuo deve essere eliminato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene ACIDO SALICILICO NA 2% unguento

- Il principio attivo è acido salicilico. 100 g di unguento contengono 2 g di acido salicilico.
- L'altro componente è vasellina bianca.

Cosa contiene ACIDO SALICILICO NA 5% unguento

- Il principio attivo è acido salicilico. 100 g di unguento contengono 5 g di acido salicilico.
- L'altro componente è vasellina bianca.

Cosa contiene ACIDO SALICILICO NA 10% unguento

- Il principio attivo è acido salicilico. 100 g di unguento contengono 10 g di acido salicilico.
- L'altro componente è vasellina bianca.

Descrizione dell'aspetto di ACIDO SALICILICO NA e contenuto della confezione

ACIDO SALICILICO NA si presenta come un unguento ed è contenuto in un tubo da 30 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.r.l. – Via Carlo Porta, 49 – Gorgonzola (MI)

Produttore

Industria Farmaceutica NOVA ARGENTIA S.r.l. – Via Pascoli, 1 – Gorgonzola – Milano

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Novembre 2024